

三次 B型肝炎免疫注射

您的寶寶將得到全面保護



B型肝炎

您的寶寶 就快出世了.....

您初生的寶寶需要您所能給予一切的爱、照顧和保護。為了確保您的寶寶不會患上常見的兒童疾病，其中一個良好的方法是讓他接受免疫注射。目前為寶寶提供的免疫注射可以預防肺結核、白喉、百日咳、破傷風、小兒麻痺症和麻疹。現在免疫注射表上又加添了一項保護您寶寶的預防措施.....。

B型肝炎

現在您可保護您的寶寶
以免染上B型肝炎

從1989年1月開始，所有政府醫院和診療所為所有的初生寶寶提供免費的B型肝炎免疫注射。



B型肝炎

什麼是B型肝炎？

它是由于肝臟受到B型肝炎濾過性病毒感染而引起的。尤其是要孩和幼童如果接觸到這種病毒最容易染上這種病症。

B型肝炎

為什麼B型肝炎如此危險？

這是由於一些人即使在感染B型肝炎而復原之後，身體內還會潛伏着它的病毒。這類病人稱為帶病毒者：

這些帶病毒者的後半生很可能會患上其他嚴重的疾病，例如慢性肝病、肝硬化、肝癌，以致最終死亡。

肝癌是世界各國，包括我國以及其他發展中國家中最普遍的十大癌症之一。

B型肝炎帶病毒者威脅到其他健康的人士，因為他們可以把病毒傳染給別人。

B型肝炎在目前還沒有治療的方法。



肝癌



如果母親是B型肝炎的帶病毒者，或者是病患者，他們所生下的嬰孩受感染的可能性非常高。這是因為在分娩的過程中，母親血液里的B型肝炎病毒，會通過臍帶傳染給嬰孩。這些受到感染的嬰孩，大多數會成為終身帶病毒者，而且一直面對患上肝癌的威脅。

事實上，初生嬰孩如果感染了B型肝炎病毒，他們成為帶病毒者的可能性最大，而這種可能性比成人和少年等其他年齡的人還要高。

B型肝炎

為預防您的寶寶成為帶病毒者
的唯一方法是在
出世后即刻給予免疫注射

由于初生嬰孩被B型肝炎病毒感染而成為帶病毒者的可能性最高，因此他們必須提早預防。現在您可以讓您的寶寶接受B型肝炎免疫注射，以預防B型肝炎。



B型肝炎免疫注射的功用是刺激初生嬰孩的身體，使他的體內產生稱為“抗體”的特別保護物質。這些物質將保護那些接受過免疫注射的嬰孩，以免受到B型肝炎病毒的感染。這樣，嬰孩就不會再面對成為帶病毒者的危險了。

B型肝炎

需要注射三次

需要依照以下的時間表按時接受三次免疫注射，才能夠完全預防B型肝炎。

第一次注射	—	剛出世時
第二次注射	—	一個月后
第三次注射	—	五個月后

B型肝炎

為什麼您的寶寶需要注射三次？

剛出世時所接受的第一次注射，是要讓您的寶寶獲得初步的預防。

出世一個月后的第二次注射，是要在第一次注射的功效消逝之前加強預防。不過，第二次注射的預防功效不會持久。

嬰孩出世5個月后接受的第三次注射，是要完成免疫的作用，同時提供持久的預防。如果您的寶寶沒有接受第三次注射，就不能全面預防。

以上所說的免疫作用可以簡列如下：

注射	預防程度
第一次注射之后	不滿意
第一和第二次注射之后	不滿意
第一、第二和第三次注射之后	滿意，並且獲得全面的預防。

注意：請確保您的寶寶接受所有三次的注射，以便獲得全面和持久的預防。

B型肝炎

疫苗是安全且具功效的

接受B型肝炎疫苗注射之後，是不會有嚴重的副作用，也不會產生任何問題的。這種疫苗是安全的：

如果按注射時間表接受完整的注射，疫苗就能夠非常有效地抗拒B型肝炎的病毒。



所有政府醫院，政府保健中心，以及大部份的私人醫院都提供B型肝炎免疫注射。

如果您在醫院分娩，您的寶寶出世后，就獲得該醫院提供第一次注射。

如果您在家里分娩，為您接生的護士，或者合格的政府助產士，將在寶寶出世后就替他進行第一次注射。

如果政府助產士沒有替您的寶寶進行第一次注射，或者您在家里分娩由傳統的接生婦接生，您就必須讓您的先生，或者家里的其他成人，抱您的初生寶寶到附近有提供免疫注射服務的政府衛生中心去接受注射。


以后您必須按注射時間表，抱您的寶寶到附近的醫院或保健中心，接受第二和第三次注射。



政府醫院



政府保健中心



請記住：

三次
B型肝炎 疫苗注射

您的寶寶將得到全面保護

Published by Health Education Unit, Ministry of Health Malaysia, 1989/A-200,000.
L-1, P.N., K.L. - Diterbitkan Oleh: Rangkaian Tenaga